

သိရှိရန် အချက်အလက်များ

ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပါက ဘေးကင်းစွာနေထိုင်ပါ။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ။



သင်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး နှစ်ပါတ်ကြာသည် အထိ COVID-19 ရောဂါမှ အပြည့်အဝ မကာကွယ်ပါ။




- သင်သည် ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးပါက ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီး 2 ပတ် ပြည့်အောင် မဖြစ်မနေ စောင့်ရပါမည်။
- သင်သည် တစ်ကြိမ်သာထိုးရန်လိုသည့် ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးထားပါက ဆေးထိုးပြီးနောက် 2 ပတ် ပြည့်အောင် မဖြစ်မနေစောင့်ရပါမည်။

ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပါက ဘေးကင်းစွာနေထိုင်ပါ။

ကာကွယ်ဆေးသည် သင့်အား COVID-19 ရောဂါမှ မည်မျှကြာ ကာကွယ်ပေးမည် သို့မဟုတ် သင်သည် ဆေးထိုးပြီးနောက် အခြားသူများထံ COVID-19 ဖြန့်ဝေနိုင်သည်ကို ပညာရှင်များအနေနှင့် မသိပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်တိုင် ဆက်လက်ပြီး



နာခေါင်းစည်းတပ်ပါ။



လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခွာခြားခြင်း (social distancing) ကို လေ့ကျင့်ပါ။



လူစုလူဝေး လုပ်ခြင်းများကို ရှောင် ကျဉ်ပါ။



သင့် လက်များကို မကြာခဏဆေးကြောပါ။



ထိတွေ့မှုများသော ဧရိယာများကို ပိုသတ် သန့်စင်ပါ။

သင်သည် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်ထိုးပြီးသည့်တိုင်အောင် COVID-19 ပိုး ရှိမရှိ အစစ်ဆေးခံပါ။



အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 ပိုးရှိသော တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် အတူရှိနေခဲ့ပြီး နေထိုင်မကောင်း စတင်ခံစားရလျှင် ထို့အပြင် အိမ်တွင်လည်းနေပါ။ အခြားသူများနှင့် ခွာနေပါ။

အကယ်၍ သင်သည် လူများစွာနှင့် အတူနေပြီး COVID-19 ပိုးရှိသော တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် အတူရှိနေခဲ့လျှင် ဖျားနာခြင်း မခံစားရသည့် တိုင်အောင် ပိုးရှိ၊ မရှိ အစစ်ဆေးခံပါ။ ထို့အပြင် အိမ်တွင်လည်းနေပါ။ အခြားသူများနှင့် ခွာနေပါ။



THE CENTER

cdc.gov/coronavirus