



تعرف على المخاطر التي تتعرض لها في حال إصابتك بالإعياء الشديد من كوفيد COVID

قد يحتاج الأشخاص الذين يصابون بأعياء شديد من كوفيد إلى رعاية في المستشفى. كما أنهم قد يتعرضوا للوفاة. البقاء على اطلاع دائم بلقاح كوفيد COVID الخاص بك هو أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بالإعياء الشديد من كوفيد COVID. بعض الناس أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالإعياء الشديد من كوفيد COVID - حتى لو تم تطعيمهم.

العوامل التي تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالإعياء الشديد من كوفيد COVID

كبار السن

يزداد خطر الإصابة بأمراض خطيرة ناتجة عن كوفيد COVID مع تقدم العمر ، خاصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر.

وهن أو ضعف جهاز المناعة

إما بسبب حالة طبية أو دواء يضعف جهاز المناعة ، مثل العلاج الكيميائي أو الكورتيكوستيرويدات.

مشاكل صحية معينة

تزيد بعض المشكلات الصحية من خطر إصابتك أكثر من غيرها. وكلما كان لديك أكثر ، زادت مخاطرك. تشمل المشكلات الصحية الشائعة التي تزيد من مخاطرك إصابتك ما يلي:

- أمراض القلب
- السكري
- الربو وأمراض الرئة الأخرى
- السرطان
- أمراض الكلى أو الكبد
- زيادة الوزن أو السمنة

هذه ليست كل المشكلات الصحية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة من كوفيد COVID. تحدث إلى طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية حول مشاكلك الصحية لفهم المخاطر الخاصة بك.

يتوفر العلاج المرخص أو المعتمد من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للمساعدة في منع أعراض الإعياء الشديد

إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بالإعياء الشديد، فأنت بحاجة إلى بدء العلاج الطبي لكوفيد COVID على الفور بعد ظهور الأعراض لأول مرة. لا تنتظر. من الضروري إجراء الاختبار بسرعة إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد COVID. يجب أن تبدأ العلاجات الموصوفة في غضون أيام من بداية ظهور الأعراض. حتى إذا كانت أعراضك خفيفة، فإن علاجك مبكرًا من مرض كوفيد -19 بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب أو مقدم رعاية صحية معتمد آخر يمكن أن يجعل العدوى أقل حدة ويساعدك على إبعادك عن المستشفى. من الممكن أن تنفذ حياتك. تحدث إلى طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية حول خطر إصابتك بالإعياء الشديد من كوفيد COVID.

تعرف على المزيد على [cdc.gov/covidtreatment](https://www.cdc.gov/covidtreatment)



آخر مراجعة للمحتوى: 12 كانون الثاني (يناير) 2023